



Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2022

Probă scrisă la matematică

Varianta 1

*Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale*

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- La toate subiectele se cer rezolvări complete.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

- 5p 1. Arătați că  $(2 - \sqrt{3})^2 - 2(3 - 2\sqrt{3}) = 1$ .
- 5p 2. Se consideră funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 5x + 4$ . Determinați coordonatele punctului de intersecție dintre graficul funcției  $f$  și axa  $Oy$ .
- 5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  $5^{6-2x} = 25$ .
- 5p 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie multiplu de 11.
- 5p 5. În reperul cartezian  $xOy$  se consideră punctele  $A(3, -5), B(1, 1)$  și  $C(-4, 6)$ . Determinați distanța de la punctul  $C$  la mijlocul segmentului  $AB$ .
- 5p 6. Triunghiul  $ABC$  are măsura unghiului  $A$  de  $60^\circ$ , măsura unghiului  $B$  de  $30^\circ$  și  $AC = 6\sqrt{3}$ . Determinați lungimea laturii  $AB$ .

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1. Se consideră matricele  $A = \begin{pmatrix} x-3 & 2 \\ -4 & x+3 \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R}$  și  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .
- 5p a) Arătați că  $\det A(0) = -1$ .
- 5p b) Demonstrați că  $A(x) \cdot A(-x) = (1 - x^2) \cdot I_2$ , oricare ar fi numărul real  $x$ .
- 5p c) Determinați numărul real  $a$  cu proprietatea că  
 $A\left(\frac{1}{2}\right) \cdot A\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot A\left(\frac{1}{3}\right) \cdot A\left(-\frac{1}{3}\right) \cdot A\left(\frac{1}{4}\right) \cdot A\left(-\frac{1}{4}\right) \cdot A\left(\frac{1}{5}\right) \cdot A\left(-\frac{1}{5}\right) = a \cdot I_2$ .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție  $x * y = 3xy + 3x + 3y + 2$ .
- 5p a) Arătați că  $x * y = 3(x+1)(y+1) - 1$ , pentru orice numere reale  $x$  și  $y$ .
- 5p b) Demonstrați că  $e = -\frac{2}{3}$  este elementul neutru al legii de compoziție „\*”.
- 5p c) Rezolvați în mulțimea numerelor reale pozitive ecuația  $(\log_2 x) * (\log_3 x) = -1$ .

1. Se consideră funcția  $f : (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{1}{x+2}$

5p a) Arătați că  $f'(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x+2)^2}, x \in (-2, \infty)$ .

5p b) Scrieți ecuația tangentei la graficul funcției  $f$  în punctul de abscisă 0 situat pe graficul funcției  $f$ .

5p c) Demonstrați că ecuația  $f(x) = 2022$  are o exact două soluții reale.

2. Se consideră funcțiile  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \ln x - 2$  și  $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + x \ln x$ .

5p a) Demonstrați că funcția  $F$  este o primitivă a funcției  $f$ .

5p b) Arătați că  $\int_2^4 (f(x) - \ln x) dx = 2$ .

5p c) Demonstrați că orice primitivă a funcției  $f$  este funcție convexă pe  $(0, \infty)$ .



Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2022

Probă scrisă la matematică

Varianta 1

*Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale*

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

**SUBIECTUL I**

(30 de puncte)

1.	$(2 - \sqrt{3})^2 = 7 - 4\sqrt{3}$	3p
	$(2 - \sqrt{3})^2 - 2(3 - 2\sqrt{3}) = 7 - 4\sqrt{3} - 6 + 4\sqrt{3} = 1$	2p
2.	Fie $\{A(a, b)\} = G_f \cap O_y$ . Cum $A \in O_y$ , rezultă că $a = 0$ .	2p
	Din $A \in G_f$ rezultă că $b = f(0) = 4$ , prin urmare punctul cerut este $A(0, 4)$ .	3p
3.	$5^{6-2x} = 25 \Leftrightarrow 6 - 2x = 2$	3p
	$x = 2$	2p
4.	Există 90 de numere naturale de două cifre, dintre care 9 sunt divizibile cu 11 (11, 22, ..., 99).	2p
	Probabilitatea evenimentului din enunț este $\frac{9}{90} = \frac{1}{10}$ .	2p
		1p
5.	Mijlocul segmentului $AB$ este punctul $M(2, -2)$ .	2p
	$CM = \sqrt{(2+4)^2 + (-2-6)^2} = 10$	3p
6.	$C = 90^\circ$	2p
	$\sin B = \frac{AC}{AB}$	1p
	$\frac{1}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{AB} \Rightarrow AB = 12\sqrt{3}$	2p

**SUBIECTUL al II-lea**

(30 de puncte)

1.a)	$A(0) = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$	2p
	$\det A(0) = -3 \cdot 3 - 2 \cdot (-4) = -1$	3p

<b>b)</b>	$A(x) \cdot A(-x) = \begin{pmatrix} (x-3)(-x-3) + 2 \cdot (-4) & 2(x-3) + 2(-x+3) \\ -4 \cdot (-x-3) - 4(x+3) & -4 \cdot 2 + (x+3)(-x+3) \end{pmatrix} =$	<b>2p</b>
	$= \begin{pmatrix} 1-x^2 & 0 \\ 0 & 1-x^2 \end{pmatrix} = (1-x^2) \cdot I_2$	<b>3p</b>
<b>c)</b>	Ținând cont de b), membrul stâng este egal cu $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\left(1 - \frac{1}{5^2}\right) \cdot I_2$ .	<b>2p</b>
	Atunci $a = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\left(1 - \frac{1}{5^2}\right) = \frac{3}{5}$ .	<b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$3(x+1)(y+1) - 1 = 3(xy + x + y + 1) - 1 =$	<b>3p</b>
	$= 3xy + 3x + 3y + 2 = x * y$ , oricare ar fi numerele reale $x$ și $y$	<b>2p</b>
<b>b)</b>	$e$ este element neutru dacă $x * e = e * x = x$ , oricare ar fi numărul real $x$	<b>2p</b>
	$x * \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}\right) * x = -2x + 3x - 2 + 2 = x$ , oricare ar fi numărul real $x$	<b>3p</b>
<b>c)</b>	$(\log_2 x) * (\log_3 x) = -1 \Leftrightarrow (\log_2 x + 1)(\log_3 x + 1) = 0$	<b>2p</b>
	Obținem că $\log_2 x = -1$ sau $\log_3 x = -1$ ,	<b>1p</b>
	de unde $x = \frac{1}{2}$ sau $x = \frac{1}{3}$ , soluții care convin.	<b>2p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+2)^2} =$	<b>3p</b>
	$= \frac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x+2)^2}, x \in (-2, \infty)$	<b>2p</b>
<b>b)</b>	Punctul are coordonatele $\left(0, \frac{1}{2}\right)$	<b>1p</b>
	Panta tangentei este $f'(x_0) = \frac{3}{4}$	<b>2p</b>
	Ecuția tangentei este $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$	<b>2p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) < 0, \forall x \in (-2, -1) \Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe intervalul $(-2, -1)$ , iar	<b>2p</b>
	$f'(x) > 0, \forall x \in (-1, +\infty) \Rightarrow f$ este strict descrescătoare pe intervalul $(-1, +\infty)$	<b>2p</b>
	$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty, f(-1) = 0$	<b>2p</b>
	Cum $2022 \in [0, +\infty)$ , există și este unic $x_1 \in (-2, -1)$ astfel încât $f(x_1) = 2022$ și există și este unic $x_2 \in (-1, +\infty)$ astfel încât $f(x_2) = 2022$ .	<b>1p</b>
<b>Notă.</b> Ecuția $f(x) = 2022$ este echivalentă cu $x^2 - 2020x - 4043 = 0$ . Soluțiile sale pot fi efectiv determinate ( <b>3p</b> ) și se verifică faptul că ambele aparțin domeniului funcției $f$ ( <b>2p</b> ).		

<b>2.a)</b>	$F'(x) = x - 3 + 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = x + \ln x - 2, x \in (0, +\infty)$ <p>Funcția <math>F</math> este derivabilă și <math>F'(x) = f(x), x \in (0, +\infty)</math>, așadar <math>F</math> este o primitivă a lui <math>f</math></p>	<p><b>3p</b></p> <p><b>2p</b></p>
<b>b)</b>	$\int_2^4 (f(x) - \ln x) dx = \int_2^4 (x - 2) dx =$ $= \left( \frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big _2^4 = (8 - 8) - (2 - 4) = 2$	<p><b>2p</b></p> <p><b>3p</b></p>
<b>c)</b>	<p>Fie <math>G : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}</math> o primitivă a funcției <math>f</math>; atunci <math>G'(x) = f(x), \forall x \in (0, +\infty)</math>.</p> $G''(x) = f'(x) = 1 + \frac{1}{x}, \forall x \in (0, +\infty)$ <p>Cum <math>G''(x) &gt; 0, \forall x \in (0, +\infty)</math>, rezultă că <math>G</math> este o funcție convexă.</p>	<p><b>1p</b></p> <p><b>2p</b></p> <p><b>2p</b></p>