

Prezenta lucrare conține \_\_\_\_\_ pagini

**SIMULARE – EVALUARE NAȚIONALĂ  
PENTRU CLASA a VIII-a**

**Anul școlar 2023-2024**

**Matematică – Simularea 1**

**(18.10.2023)**

Numele: .....

Inițiala prenumelui tatălui: .....

Prenumele: .....

Școala de proveniență: .....

Centrul de examen: .....

Localitatea: .....

Județul: .....

Nume și prenume asistent	Semnătura

A	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ȘI LITERE)	NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI	SEMNĂTURA
	EVALUATOR I			
	EVALUATOR II			
	EVALUATOR III			
	EVALUATOR IV			
	NOTA FINALĂ			

B	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ȘI LITERE)	NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI	SEMNĂTURA
	EVALUATOR I			
	EVALUATOR II			
	EVALUATOR III			
	EVALUATOR IV			
	NOTA FINALĂ			

C	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ȘI LITERE)	NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI	SEMNĂTURA
	EVALUATOR I			
	EVALUATOR II			
	EVALUATOR III			
	EVALUATOR IV			
	NOTA FINALĂ			

- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de două ore.

**Subiectul I**

**(30 puncte)**

*Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.*

(5 p.) **1.** Rezultatul calculului  $\sqrt{4} + 2 : \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$  este :

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

(5 p.) **2.** 80% din prețul unui produs reprezintă 640 lei. Prețul produsului este de:

- a) 600 lei
- b) 800 lei
- c) 700 lei
- d) 1000 lei

(5 p.) **3.** Numărul submulțimilor cu cel mult două elemente din mulțimea  $A = \{1, 2, 3\}$  este:

- a) 3
- b) 6
- c) 7
- d) 8

(5 p.) 4. Suma dintre cel mai mic și cel mai mare număr întreg din intervalul  $(-3; 6]$  este:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 3

(5 p.) 5. Patru elevi au calculat valoarea raportului  $\frac{a}{b}$ , unde  $a = \sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{50}$  și  $b = \sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{72}$ . Rezultatele obținute sunt trecute în tabelul de mai jos:

Radu	Manu	Ana	Maria
0.5	0.4	1	2

Dintre cei patru elevi, a răspuns corect:

- a) Radu
- b) Manu
- c) Ana
- d) Maria

(5 p.) 6. Numărul de numere iraționale din mulțimea  $A = \{ \sqrt{0, (1)}; \sqrt{0, 01}; \sqrt{0, 1}; \sqrt{1} \}$  este:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

## Subiectul II

(30 puncte)

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


(5 p.) 1. În figura alăturată, punctele  $A$ ,  $B$  și  $C$  sunt coliniare, în această ordine. Mijlocul lui  $AB$  este notat cu  $M$ , iar  $C$  este simetricul lui  $B$  față de  $N$ . Dacă  $AB = 8$  cm și  $BC = 14$  cm, atunci  $MN$  este:

- a) 10 cm
- b) 11 cm
- c) 12 cm
- d) 13 cm




(5 p.) **2.** În figura alăturată este reprezentat trapezul isoscel  $ABCD$ , unde  $AB \parallel CD$ ,  $AB > CD$ , și  $AD = BC = 15$  cm. Dacă  $AC \perp BC$  și  $AC = 20$  cm, atunci perimetrul trapezului este:

- a) 54 cm
- b) 60 cm
- c) 62 cm
- d) 64 cm




(5 p.) **3.** Într-un cub, suma lungimilor tuturor muchiilor este 96 cm. Aria bazei cubului este:

- a)  $64 \text{ cm}^2$
- b)  $44 \text{ cm}^2$
- c)  $81 \text{ cm}^2$
- d)  $96 \text{ cm}^2$




(5 p.) **4.** În figura alăturată este reprezentat triunghiul  $\triangle ABC$  dreptunghic în  $A$ , cu  $AB = 12$  cm și  $AC = 16$  cm. Sinusul unghiului  $C$  este egal cu:

- a) 0,5
- b) 0,6
- c) 0,7
- d) 0,8




(5 p.) **5.** În figura alăturată, dreptele  $a$  și  $b$  sunt paralele, iar secanta  $c$  intersectează dreptele  $a$  și  $b$  în punctele  $A$ , respectiv  $B$ . Valoarea lui  $x$  este egală cu:

- a)  $21^\circ$
- b)  $22^\circ$
- c)  $23^\circ$
- d)  $24^\circ$



(5 p.) **6.** Se consideră 4 puncte necoplanare  $A$ ,  $B$ ,  $C$  și  $D$ . Numărul maxim de plane determinate de oricare 3 dintre puncte este:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5





3. Se consideră numerele reale:

$$a = \left(2\sqrt{10} - \frac{10}{\sqrt{10}}\right) \cdot 2\sqrt{5}; b = \left(\frac{5}{\sqrt{27}} + \frac{1}{\sqrt{12}} - \frac{7}{\sqrt{108}}\right) \cdot \sqrt{15}$$

(2 p.) a) Arătați că  $a = 10\sqrt{2}$ .






(3 p.) b) Dacă  $x = a\sqrt{2} + b\sqrt{5}$ , arătați că  $x$  este număr natural pătrat perfect.




4. Se consideră  $\triangle ABC$  isocel cu  $AB = AC = 10$  cm;  $BC = 12$  cm, iar  $D$  mijlocul lui  $BC$  și  $M$  simetricul lui  $D$  față de  $AC$ ; iar  $AC \cap DM = \{E\}$ .

(2 p.) a) Arătați că  $AM = AD$ .





(3 p.) b) Aflați aria  $\triangle DEC$ .



5. Se consideră pătratul  $ABCD$  și triunghiul echilateral  $\triangle DMC$ ,  $M \notin \text{Int}(ABCD)$ . Dacă  $AB = 6$  cm și  $MB \cap DC = \{N\}$ .

(2 p.) a) Aflați măsura  $\sphericalangle AMB$






(3 p.) b) Arătați că  $NC = 6(2 - \sqrt{3})$ cm



6. Fie  $\triangle ABC$  echilateral și  $M$  un punct exterior planului  $(ABC)$  astfel încât  $MA = 3\sqrt{2}$  cm;  $MB = MC = \sqrt{30}$  cm și  $MN = 3\sqrt{2}$  cm, unde  $N$  este mijlocul lui  $BC$ .

(2 p.) a) Aflați dreapta de intersecție dintre planele  $(ABN)$  și  $(MAC)$ .



(3 p.) b) Arătați că perimetrul  $\triangle MAN$  este mai mic de 15 cm.



**BAREM DE CORECTARE**  
**SIMULARE 1 - 18.10 .2023**  
**CLASA a 8-a**

**SUBIECTUL I**

1. C
2. B
3. C
4. A
5. A
6. A

**SUBIECTUL II**

1. B
2. C
3. A
4. B
5. A
6. C

**SUBIECTUL III**

1. a)  $|\frac{2x-1}{3}| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq \frac{2x-1}{3} \leq 3 \dots\dots\dots 1p$   
 $A = [-4; 5] \dots\dots\dots 1p$   
 b)  $B = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\} \dots\dots\dots 2p$   
 $A \cap B = B \Rightarrow \text{card}(A \cap B) = 8 \dots\dots\dots 1p$
2. a) Presupunem că ar putea fi 51 de elevi,  $51 - 2 = 49 \dots\dots\dots 1p$   
 $3 \nmid 49 \Rightarrow$  Nu pot fi 51 de elevi  $\dots\dots\dots 1p$   
 b)  $b =$  nr. de bănci,  $e =$  nr. de elevi  

$$\begin{cases} 2(b-8) + 1 = e \\ 3(b-16) + 2 = e \end{cases} \Leftrightarrow 2(b-8) + 1 = 3(b-16) + 2 \dots\dots\dots 2p$$
  
 $b = 31$  (nr. de bănci)  $\dots\dots\dots 1p$
3. a)  $a = 10 \left( 2\sqrt{10} - \frac{10}{\sqrt{10}} \right) \cdot 2\sqrt{5} = \frac{10}{\sqrt{10}} \cdot 2\sqrt{5} = \frac{20}{\sqrt{2}} \dots\dots\dots 1p$   
 $a = 10\sqrt{2} \dots\dots\dots 1p$   
 b)  $b = \sqrt{5} \dots\dots\dots 2p$   
 $x = a\sqrt{2} + b\sqrt{5} = 25 = 5^2 \rightarrow p.p. \dots\dots\dots 1p$
4. a)  $\triangle AED \equiv \triangle AEM$  (cazul C.C.)  $\dots\dots\dots 1p$   
 $\Rightarrow AD \equiv AM \dots\dots\dots 1p$   
 b)  $A_{\triangle ADC} = \frac{AD \cdot DC}{2} = 24 \text{ cm}^2 \dots\dots\dots 1p$   
 $\triangle DEC \sim \triangle ADC$  (cazul u.u.)  $\Rightarrow \frac{DC}{AC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \dots\dots\dots 1p$   
 $\frac{A_{\triangle DEC}}{A_{\triangle ADC}} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{A_{\triangle DEC}}{24} = \frac{9}{25} \Rightarrow A_{\triangle DEC} = \frac{216}{25} = 8,64 \text{ cm}^2 \dots\dots\dots 1p$
5. a)  $\sphericalangle AMD = \sphericalangle BMC = 15^\circ \dots\dots\dots 1p$   
 $\sphericalangle AMB = 60^\circ - 15^\circ - 15^\circ = 30^\circ \dots\dots\dots 1p$   
 b) Fie  $MP \perp AB, P \in AB$  și  $MP \cap DC = \{S\}$ .  
 $MP = MS + SP = 3\sqrt{3} + 6 \dots\dots\dots 1p$   
 $\triangle BCN \sim \triangle MPB$  (cazul u.u.)  $\Rightarrow \frac{BC}{MP} = \frac{BN}{MB} = \frac{CN}{PB} \dots\dots\dots 1p$   
 $\frac{6}{6+3\sqrt{3}} = \frac{CN}{3} \Rightarrow CN = \frac{18}{3(2+\sqrt{3})} = \frac{6}{2+\sqrt{3}} = 6(2-\sqrt{3}) \dots\dots\dots 1p$
6. a)  $(ABN) = (ABC) \dots\dots\dots 1p$   
 $(ABN) \cap (MAC) = AC \dots\dots\dots 1p$   
 b)  $\triangle MBC$  isoscel,  $N$  mijl lui  $BC \Rightarrow MN \perp BC$  Cu T. Pitagora în  $\triangle MNC \Rightarrow NC = 2\sqrt{3} \text{ cm} \Rightarrow BC = 4\sqrt{3} \dots\dots\dots 1p$   
 $\triangle ABC$  echilateral,  $BC = 4\sqrt{3} \Rightarrow AN = 6 \text{ cm} \dots\dots\dots 1p$   
 $P_{\triangle MAN} = MA + AN + MN = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 6 = 6\sqrt{2} + 6$   
 $6\sqrt{2} + 6 < 15 \Leftrightarrow 6\sqrt{2} < 9 \Leftrightarrow 2\sqrt{2} < 3 \Leftrightarrow \sqrt{8} < \sqrt{9} \Rightarrow P_{\triangle MAM} < 15 \text{ cm} \dots\dots\dots 1p$