



1. Parmi ces antibiotiques lesquels appartiennent aux Macrolides
A. Cefotaxime
B. Ciproloxacine
C. Spiramycine
D. Gentamycine
E. Erythromycine
2. L'amoebose intestinale se manifeste (RJ)
A. Fièvre
B. Tenesmes
C. Epreintes
D. Envie impérieuse d'aller à la selle
E. Aucune réponse juste
3. les arguments en faveur d'un sepsis a BGN sont :
A. Fièvre, hypotension, altération de l'état général (AEG)
B. La porte d'entrée urinaire
C. Présence d'un ecthyma gangreneux
D. Des images radiologiques pulmonaires labiles dans le temps et dans l'espace
E. Toutes les réponses sont justes
4. les arguments en faveur d'un sepsis a staphylocoque sont :
A. Fièvre, hypotension, AEG
B. Porte d'entrée cutanée
C. La localisation prostatique
D. Des lésions cutanées bulleuses
E. Toutes les réponses sont justes
5. lecture d'un LCS aspect eau de roche a 100 elts dont 86% lymphocytes, glycorrachie a 0,9 g/l (glycémie concomitante a 1g20), protéine a 0,9 examen directe négatif, culture en cours. A noter qu'il n'y a aucun signe neurologique :
A. Méningite lymphocytaire hypoglycorrachique probablement tuberculeuse
B. Méningite lymphocytaire hypoglycorrachique probablement listérienne
C. Méningoencéphalite herpétique
D. Méningite lymphocytaire virale bénigne
E. Toutes les réponses sont fausses

6. Dans le Tétanos :

- A. Le germe est tellurique
- B. Il s'agit d'un sepsis à point de départ lymphatique
- C. L'atteinte urinaire est prédominante
- D. La contamination est interhumaine
- E. Toutes les réponses sont justes

7. la leptospirose est :

- A. Une zoonose
- B. Transmise par le lait de vache contaminée
- C. Le réservoir est l'homme principalement
- D. Survient en été
- E. La forme typique et grave étant la forme ictero.hémorragique

8. La brucellose est :

- A. Une MST (maladie sexuellement transmissible)
- B. A transmission sanguine
- C. Zoonose
- D. Le réservoir est principalement l'homme
- E. Aucune réponse juste

9. dans le paludisme :

- A. La transmission est interhumaine active
- B. L'Algérie est un pays de forte endémicité
- C. La fièvre est très importante dans le cycle hépatocyttaire (extra érythrocytaire)
- D. Le genre le plus redoutable étant le malarea
- E. Toutes les réponses sont fausses *falci...*

10. La fièvre typhoïde est une bactériémie à porte d'entrée digestive de diffusion lymphatique, classée en septénaire ; ayant les caractéristiques suivantes :
Cochez la/les réponses justes :

- A. Le 1er septénaire est celui de la période d'incubation.
- ? B. La phase d'état est appelée le 2^{ème} septénaire.
- C. Est une maladie à transmission hydrique.
- D. Les complications toxiniques sont inapparentes.
- E. La transmission peut se faire par contact avec les animaux.

11. Les infections streptococciques sont variées et polymorphes ; l'érysipèle est une forme suppurative des infections streptococciques caractérisé par :
Cochez la/les réponses justes :

- A. Est une dermoépidermite nécrosante.
- B. Est une dermohypodermite aiguë localisée.
- C. Est une maladie contagieuse.
- D. La fasciite nécrosante est la complication la plus redoutable.
- E. Est souvent localisé au niveau de thorax.

12. La diphtérie est une **toxi-infection grave due à *Corynebacterium Diphtheriae***, C'est une **urgence diagnostique et thérapeutique**, son traitement comprend : Cochez la/les réponses justes :
- A. La sérothérapie.
 - B. L'alitement strict du malade.
 - C. La vaccination.
 - D. L'antibiothérapie.
 - E. L'isolement respiratoire du malade et la déclaration obligatoire.
13. Une **infection associée aux soins** est une infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient. Elles sont plus fréquentes dans : Cochez la/les réponses justes :
- A. Les services de réanimation.
 - B. Les services de chirurgie.
 - C. Les services d'infectiologie.
 - D. Les services d'onco-hématologie.
 - E. Les services d'épidémiologie.
14. La **toxoplasmose** est une zoonose cosmopolite due à *Toxoplasma gondii*, la forme acquise du patient immunocompétent est : Cochez la/les réponses justes :
- A. Souvent asymptomatique.
 - B. Souvent suraiguë mortelle.
 - C. Se complique toujours d'une myocardite.
 - D. L'évolution est souvent bénigne spontanément.
 - E. Nécessite un traitement spécifique en urgence.
15. **Toxoplasmose congénitale** est **Primo infection** au cours de la grossesse, elle est d'autant plus grave que l'infestation du fœtus a lieu précocement, le dépistage d'une infection toxoplasmique chez une femme enceinte repose sur :
- A. La clinique.
 - B. La mise en évidence du parasite dans le sang périphérique de la maman.
 - C. La TDM cérébrale.
 - D. La sérologie.
 - E. L'interrogatoire de la patiente.
16. La **rubéole congénitale évolutive** correspond à l'**infection virale chronique généralisée du nouveau-né**, elle est caractérisée par : Cochez la/les réponses justes :
- A. Elle est généralement associée à des malformations constatées dès la naissance.
 - B. Elle entraîne des lésions pluri-viscérales.
 - C. Le pronostic est bon.
 - D. La mortalité est élevée.
 - E. Le nouveau-né est très contagieux pendant 6 mois et parfois plus de 12 mois.

17. Le choléra est une toxi-infection intestinale aiguë, contagieuse, diarrhéique, à transmission hydrique, son traitement repose sur : Cochez la/les réponses justes :

- A. Abstention thérapeutique.
- B. La réhydratation qui doit être rapide, précoce et efficace.
- C. Déclaration obligatoire.
- D. Antibiothérapie qui diminue le volume et la durée de la diarrhée.
- E. Vaccin induisant une protection à long terme contre le choléra.

18. La bactérie **VIBRIO CHOLERA**E de la famille des vibrionaceae est un pathogène qui sécrète une toxine responsable de choléra, c'est un :

- A. Bacille gram négatif en forme de bâtonné incurvé en virgule.
- B. Anaérobie strict.
- C. Sécrétant une exotoxine
- D. Pousse sur des milieux de culture usuels.
- E. Pousse sur des milieux alcalins et hypersalés.

19. Devant toute convulsion chez un HIV positif il faut :

- A. demander Une TDM cérébrale
- B. une FNS
- C. penser à une toxoplasmose cérébrale
- D. orienter chez un neurologue
- E. toutes les réponses sont justes

20. Les facteurs de risque d'une dermohypodermite aiguë non nécrosante sont :

- A. l'obésité
- B. La cachexie
- C. le diabète
- D. un lymphome
- E. toutes les réponses sont fausses

4

Barème par question :

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	CE		
2	BCD		
3	ABC		
4	ABCDE	ABCD	E
5	D		
6	A		
7	AE		
8	C		
9	E		
10	BC		
11	BD		
12	ACDE		
13	ABD		
14	AD		
15	D		
16	ABDE		
17	BCD		
18	ACE		
19	AC		
20	ACD		

[Signature]
Pr. NF. TAD...
Professeur
Chef du service
CIV