

79. Un bărbat de 25 de ani este internat în secția de terapie intensivă după o supradoză cu substanță necunoscută. Din cauza unei scăderi progresive a nivelului de conștiență, care nu se ameliorează cu naloxonă sau flumazenil, se decide intubația și ventilarea mecanică invazivă. Care dintre următoarele medicamente **NU** ar fi utilizat pentru intubația orotraheală?

1. Quetiapină
 2. Rocuroniu
 3. Etomidat
 4. Fentanil
-

80. Un bărbat de 50 de ani cu pneumonie cu *Legionella* necesită internare în terapie intensivă din cauza insuficienței respiratorii acute. Este necesară intubația și conectarea la ventilație mecanică invazivă. Este diagnosticat cu sindrom de detresă respiratorie acută și este plasat în poziție de decubit ventral. Referitor la această tehnică posturală, indicați afirmația **INCORECTĂ**:

1. Se realizează pentru a încerca să crească raportul dintre presiunea parțială a oxigenului și fracția de oxigen inspirat.
 2. Se efectuează de personal instruit pentru a preveni complicațiile.
 3. Raportul dintre presiunea parțială a oxigenului și fracția de oxigen inspirat sub care este recomandată tehnica este de 300 mmHg.
 4. Poziția de decubit ventral în timpul ventilației mecanice invazive necesită sedare profundă.
-

81. Un pacient de 58 de ani suferă de pneumonie COVID-19 și necesită intubație cu ventilație mecanică în secția de terapie intensivă. După o săptămână, i se efectuează traheostomie, însă pacientul necesită în continuare ventilație mecanică. Se observă un deficit motor la nivelul celor patru membre, însoțit de hiporeflexie generalizată. Orientarea diagnostică inițială și atitudinea terapeutică sunt:

1. Sindrom Guillain-Barré. Confirmarea diagnosticului prin teste complementare.
2. Sindrom post-COVID. Reabilitare respiratorie.

3. Miopatie de boală critică. Corticosteroizi și investigații complementare.
4. Miopatie de boală critică. Reabilitare respiratorie și motorie intensivă.