

EXAMEN ANATOMIE PATOLOGICA – SEM. II – MG III – LINIA ROMANA

**Nr. 3.**

**1. Boala hipertensiva se caracterizeaza prin:**

- a. Microscopic, apare hipertrofia miocitelor
- b. Este cauza posibila pentru accident vascular cerebral
- c. Este cauza posibila pentru nefroscleroza
- d. Peretele ventriculului stâng devine mai subțire de 3 cm

**2. Carcinomul renal:**

- a. Cel mai frecvent subtip – carcinomul cu celule clare
- b. Poate prezenta hematurie
- c. Este o tumora frecventa la sugar
- d. Apare de regulă la adulți

**3. Sarcina tubara se caracterizeaza prin:**

- a. Vilozitati coriale in lumentul trompei uterine
- b. Complicatie posibilă- hemoperitoneu
- c. Macroscopic, salpinge de dimensiuni mici, aplatazate
- d. Lipsa vilozităților coriale la nivelul trompei uterine

**4. Edemul pulmonar acut prezinta:**

- a. Capilare alveolare dilatate
- b. Acumulare de lichid intraalveolar
- c. Infiltrat inflamator difuz
- d. Lichid seros in cavitatea pleurală

**5. Leiomiomul uterin este:**

- a. Leziune benignă
- b. Formatiune incapsulată
- c. Tumoră malignă cu risc crescut de malignizare
- d. Proliferare de fibre musculare striate

**6. Hemopericardul poate aparea in:**

- a. Traumatisme cardio-pulmonare
- b. Ruptura postinfarct miocardic
- c. Insuficiență cardiac stanga
- d. Obstrucție limfatică

**7. Poliarterita nodoasa:**

- a. Poate afecta vasele renale
- b. Prezinta necroza fibrinoida in peretele vascular
- c. Afecteaza frecvent vasele rinichiului
- d. Apare necroză de lichefiere

**8. Hiperplazia de prostata:**

- a. Se caracterizeaza prin scaderea numarului de glande/acini prostatici
- b. Apare tipic la barbații între 20-30 de ani
- c. Este asociată cu metastaze osoase
- d. Poate asocia infectii ale tractului urinar

**9. Prolapsul de valva mitrala:**

- a. Este o formă de stenoza tricuspidiană
- b. Reprezintă bombarea valvei mitrale în atriu stâng în timpul sistolei
- c. Afectează valva mitrală cu protruzie în atriu drept
- d. Apare îngustarea orificiului aortic

**10. Glomerulonefrita acuta poststreptococica se caracterizeaza prin:**

- a. Depozite de complexe immune la nivelul glomerulului
- b. Sindrom nefrotic
- c. Se asociază proteiurie severă fără hematurie
- d. Sindrom nefritic

**11. Sarcoidoza pulmonara asociaza:**

- a. Microabcese pulmonare
- b. Leziuni cutanate, oculare, adenopatii
- c. Granuloame cu necroza cazeoasă
- d. Granuloame noncazeoase

**12. Endometrioza reprezinta:**

- a. Tesut endometrial ectopic
- b. Teratom imatur
- c. Transformare neoplazica a miometrului
- d. Tumoră chistica benignă

EXAMEN ANATOMIE PATOLOGICA – SEM. II – MG III – LINIA ROMANA

**13. Rectocolita ulcerohemoragica asociaza:**

- a. Scăderea riscului de cancer colonic
- b. Afectarea mucoasei discontinua
- c. Scaune cu mucus și sange
- d. Inflamatie intramurala

**14. Complicatiile bronsiectaziilor pot fi:**

- a. Abcese metastatice
- b. Cord pulmonar cronic
- c. Insuficienta cardiaca stanga
- d. Amiloidoza sistemica secundară

**15. Astmul se caracterizeaza prin:**

- a. Plamani colabati, hemoragici
- b. Cristale eozinofile vizibile microscopic
- c. Hipertrofie glandulară detectabilă macroscopic
- d. Macroscopic, plamani cu dopuri de mucus

**16. Varicocelul reprezinta:**

- a. Dilatatia venelor plexului pampiniform
- b. Varice la nivelul esofagului distal
- c. Tromboflebita
- d. Inflamația acută a vaselor testiculare

**17. Ciroza hepatica are urmatoarele caracteristici microscopice:**

- a. Regenerarea nodulară hepatocitară
- b. Canalicule biliare neoformate
- c. Structura lobulara hepatica intacta
- d. Splenomegalie

**18. Cancerul de col uterin:**

- a. Poate fi carcinom scuamos
- b. Este frecvent asociat cu infectia HPV
- c. caracteristic pacientelor sub 15 ani
- d. Poate fi adenocarcinom

**19. Diminuarea marcata a pulsului in extremitatile superioare este caracteristica urmatoarei vasculite:**

- a. Granulomatoza Wegener
- b. Arterită temporală
- c. Boala Takayasu
- d. Boală Buerger

**20. Condilomul vulvar:**

- a. Este o leziune asociata infectiei HPV si prezinta koilocite
- b. Estre o tumora maligna invaziva
- c. Se tratează prin indepartarea uterului
- d. Apare în contextual infecției cu virus Epstein-Barr

**Sub 2. Bilet nr.....**

**Bilet nr.....**