

41. Sunt antipsihotice cu biodisponibilitate orală >70%:
- A. Aripiprazol
  - B. Tiaprida
  - C. Sertindol
  - D. Risperidonă
  - E. Clozapina
42. Sunt opțiuni terapeutice pentru tratamentul diskineziei tardive:
- A. Valbenazină
  - B. Tetrabenazină
  - C. Aripiprazol
  - D. Risperidonă
  - E. Levodopa
43. Sunt potențiale indicații terapeutice ale antipsihoticelor
- A. Sindrom depresiv major
  - B. Simptome comportamentale ale demenței
  - C. Tulburare de stres posttraumatic
  - D. Episoade maniacale
  - E. Insomnie datorată decalajului de fus orar
44. Antipsihoticele utilizate în tratamentul sindromului depresiv major includ:
- A. Haloperidol
  - B. Aripiprazol
  - C. Flufenazină
  - D. Clorpromazină
  - E. Quetiapină

#### IV. Antidepresive

##### COMPLEMENT SIMPLU – UN SINGUR RĂSPUNS CORECT

1. Este antidepresiv inhibitor al recaptării NA:
- A. Venlafaxina
  - B. Reboxetina
  - C. Bupropiona
  - D. Fluoxetina
  - E. Escitalopram
2. Este antidepresiv inhibitor selectiv al recaptării 5-HT (ISRS):
- A. Escitalopram
  - B. Desipramina
  - C. Doxepina
  - D. Duloxetina
  - E. Venlafaxina
3. Alegeți medicamentul antidepresiv triciclic (ATC) clasic:
- A. Mianserina
  - B. Reboxetina
  - C. Buspirona
  - D. Nortriptilina
  - E. Mianserina

4. **Este antidepresiv inhibitor selectiv al recaptării 5-HT (ISRS):**
  - A. Milnacipran
  - B. Desipramina
  - C. Sertralina
  - D. Vortioxetina
  - E. Venlafaxina
  
5. **Este antidepresiv modulator serotoninergic și/sau noradrenergic:**
  - A. Reboxetina
  - B. Desipramina
  - C. Nortriptilina
  - D. Mianserina
  - E. Duloxetina
  
6. **Este antidepresiv modulator serotoninergic și/sau noradrenergic:**
  - A. Doxepina
  - B. Mirtazapina
  - C. Venlafaxina
  - D. Sertralina
  - E. Desipramina
  
7. **Este antidepresiv inhibitor al monoaminoxidazei (IMAO) selectiv IMAO-A:**
  - A. Tianeptina
  - B. Moclobemida
  - C. Doxepina
  - D. Mianserina
  - E. Nefazodona
  
8. **Este antidepresiv inhibitor al monoaminoxidazei (IMAO) selectiv IMAO-B:**
  - A. Tianeptina
  - B. Paroxetina
  - C. Mianserina
  - D. Selegilina
  - E. Trazodona
  
9. **Este antidepresiv antagonist glutamatergic:**
  - A. Selegilina
  - B. Agomelatina
  - C. Tianeptina
  - D. Maprotilina
  - E. Bupropiona
  
10. **Este antidepresiv antagonist glutamatergic:**
  - A. Fluvoxamina
  - B. Esketamina
  - C. Agomelatina
  - D. Desipramina
  - E. Paroxetina
  
11. **Medicamentele de elecție în tratamentul depresiei sunt:**
  - A. Antidepresivele triciclice (ATC)
  - B. Antagoniștii glutamatergici

- C. Inhibitoarele selective ale recaptării serotoninei (ISRS)  
D. Inhibitoarele monoaminoxidazei (MAO)  
E. Inhibitoarele recaptării dopaminei și slab a noradrenalinei
12. **Antidepresivele ISRS pot avea următorul efect secundar serotoninergic prin stimularea receptorilor 5HT<sub>2A</sub>:**  
A. Tulburări vasculare cerebrale  
B. Simptome maniacale  
C. Greață  
D. Vărsături  
E. Cefalee
13. **Alegeți medicamentul antidepresiv care are în general profilul farmacologic al ISRS și este indicat în neuropatia diabetică dureroasă:**  
A. Trazodona  
B. Mianserina  
C. Bupropiona  
D. Duloxetina  
E. Venlafaxina
14. **Alegeți antidepresivul care este utilizat în tratamentul renunțării la fumat:**  
A. Buspirona  
B. Doxepina  
C. Nortriptilina  
D. Bupropiona  
E. Risperidona
15. **Efectele serotoninergice ale antidepresivelor ISRS sunt potențate de asocierea cu:**  
A. Amoxicilina  
B. Linezolid  
C. Penicilina V  
D. Cefuroxim  
E. Gentamicina

**COMPLEMENT MULTIPLU: 2, 3, 4 RĂSPUNSURI CORECTE**

16. **Sunt antidepresive inhibitoare ale recaptării NA:**  
A. Maprotilina  
B. Reboxetina  
C. Bupropiona  
D. Fluvoxamina  
E. Vortioxetina
17. **Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptării 5-HT (ISRS):**  
A. Paroxetina  
B. Doxepina  
C. Escitalopram  
D. Venlafaxina  
E. Fluvoxamina
18. **Sunt antidepresive triciclice (ATC) clasice:**  
A. Amitriptilina  
B. Doxepina

**190 REZIDENȚIAT FARMACIE. TESTE GRILĂ DE FARMACOLOGIE ȘI TOXICOLOGIE**

- C. Mirtazapina  
D. Reboxetina  
E. Mianserina
- 19. Sunt antidepresive tricyclice (ATC) clasice:**
- A. Desipramina  
B. Nortriptilina  
C. Bupropiona  
D. Clomipramina  
E. Mianserina
- 20. Sunt antidepresive modulatori serotoninerge și/sau noradrenerge:**
- A. Doxepina  
B. Mirtazapina  
C. Mianserina  
D. Sertralina  
E. Desipramina
- 21. Sunt antidepresive modulatori serotoninerge și/sau noradrenerge:**
- A. Trazodona  
B. Mirtazapina  
C. Nefazodona  
D. Paroxetina  
E. Venlafaxina
- 22. Sunt antidepresive antagoniști glutamatergi:**
- A. Tianeptina  
B. Esketamina  
C. Mirtazapina  
D. Citalopram  
E. Paroxetina
- 23. Sunt reacții adverse comune tuturor antidepresivelor:**
- A. Efectul rebound  
B. Ototoxicitatea  
C. Insuficiența corticosuprarenală  
D. Sindromul serotonergic  
E. Creșterea ideții suicidare
- 24. Sunt efecte secundare anticolinergice centrale induse de antidepresivele tricyclice (ATC):**
- A. Tulburări de gândire  
B. Constipație  
C. Confuzie  
D. Tulburări de concentrare  
E. Retenție urinară
- 25. Notați antidepresivele care au acțiune antihistaminică și produc sedare intensă, în special la începutul tratamentului:**
- A. Escitalopram  
B. Amitriptilina  
C. Reboxetina  
D. Doxepina  
E. Tianeptina

26. **Antidepresivele triciclice (ATC) sunt indicate în:**
- A. Astm bronșic
  - B. Enurezis nocturn
  - C. Insomnie
  - D. Depresie
  - E. Dureri cronice
27. **Alegeți medicamentele care pot potența efectele anticolinergice ale antidepresivelor triciclice:**
- A. Metamizol
  - B. Oxibutinina
  - C. Trihexifenidil
  - D. Difenhidramina
  - E. Butilscolamina
28. **Antidepresivele ISRS asociază și efect anxiolitic util în:**
- A. Tulburare de coagulare
  - B. Tulburare anxioasă generalizată
  - C. Tulburare de panică
  - D. Tulburare anxioasă socială
  - E. Tulburare de creștere
29. **Antidepresivele ISRS pot avea următoarele efecte secundare serotoninergice prin stimularea receptorilor 5HT<sub>2B</sub>:**
- A. Anorexie
  - B. Tulburări vasculare cerebrale
  - C. Celafec
  - D. Greață
  - E. Migrenă
30. **Antidepresivele ISRS pot avea următoarele efecte secundare serotoninergice prin stimularea receptorilor 5HT<sub>3</sub>:**
- A. Tulburări vasculare cerebrale
  - B. Celafec
  - C. Simptome maniacale
  - D. Greață
  - E. Vărsături
31. **Antidepresivele ISRS prezintă următoarele indicații terapeutice:**
- A. Tulburare de panică
  - B. Tulburare anxioasă socială
  - C. Tulburare obsesiv-compulsivă
  - D. Tulburare de coagulare
  - E. Tulburări ale metabolismului lipidic
32. **Care dintre antidepresivele ISRS sunt inhibitoare ale enzimei CYP2D6:**
- A. Fluoxetina
  - B. Fluvoxamina
  - C. Paroxetina
  - D. Sertralina
  - E. Mianserina
33. **Care dintre antidepresivele ISRS sunt inhibitoare ale enzimei CYP2C19:**
- A. Fluoxetina
  - B. Fluvoxamina

**192 REZIDENȚIAT FARMACIE. TESTE GRILĂ DE FARMACOLOGIE ȘI TOXICOLOGIE**

- C. Doxepina
- D. Sertralina
- E. Reboxetina

**34. Prin inhibiția CYP2D6, paroxetina poate crește concentrația plasmatică a următoarelor medicamente:**

- A. Clopidogrel
- B. Metoprolol
- C. Aripiprazol
- D. Risperidona
- E. Clozapina

**35. Alegeți medicamentele care, la asociere cu citalopramul, pot prelungi intervalul QT:**

- A. Ondansetron
- B. Paliperidona
- C. Tramadol
- D. Clozapina
- E. Bupropiona

## TEMA X. MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL BOLILOR PSIHICE – Răspunsuri

### I. Hipnotice

- |       |                |
|-------|----------------|
| 1. D  | 16. A, B, C    |
| 2. A  | 17. B, D, E    |
| 3. C  | 18. A, C       |
| 4. E  | 19. A, E       |
| 5. D  | 20. A, B, D, E |
| 6. B  | 21. B, C, E    |
| 7. A  | 22. B, C, D    |
| 8. C  | 23. A, C       |
| 9. E  | 24. A, B, C, D |
| 10. A | 25. B, C, E    |
| 11. A | 26. A, C, E    |
| 12. C | 27. A, B       |
| 13. D | 28. B, C, D,   |
| 14. C | 29. A, B, C    |
| 15. C | 30. A, B       |

### II. Anxiolitice

- |      |       |
|------|-------|
| 1. A | 7. A  |
| 2. C | 8. D  |
| 3. D | 9. C  |
| 4. B | 10. A |
| 5. E | 11. A |
| 6. C | 12. E |

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 13. D          | 22. A, B, C |
| 14. B          | 23. B, D    |
| 15. D          | 24. B, C, D |
| 16. A, B, C, E | 25. A, B, E |
| 17. B, C       | 26. A, C, D |
| 18. C, D, E    | 27. A, C, D |
| 19. A, B, D, E | 28. A, B, C |
| 20. A, B, C, D | 29. C, D    |
| 21. C, D       | 30. A, D    |

### III. Antipsihotice

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. C           | 23. A, B, C, E |
| 2. B           | 24. A, B, C    |
| 3. E           | 25. A, B       |
| 4. B           | 26. A, D, E    |
| 5. C           | 27. B, C, E    |
| 6. A           | 28. A, B, D    |
| 7. E           | 29. B, D       |
| 8. B           | 30. A, B, C    |
| 9. A           | 31. C, D, E    |
| 10. C          | 32. A, C, E    |
| 11. D          | 33. A, B, E    |
| 12. E          | 34. B, C, D    |
| 13. C          | 35. A, B, C, D |
| 14. E          | 36. A, B, D, E |
| 15. D          | 37. B, D, E    |
| 16. D          | 38. A, B, C, E |
| 17. A          | 39. A, C, E    |
| 18. A, B, E    | 40. A, B, E    |
| 19. B, C       | 41. A, B, C, D |
| 20. A, B, D    | 42. A, B       |
| 21. A, B, D    | 43. A, B, D    |
| 22. A, B, C, E | 44. B, E       |

### IV. Antidepresive

- |       |                |
|-------|----------------|
| 1. B  | 14. D          |
| 2. A  | 15. B          |
| 3. D  | 16. A, B       |
| 4. C  | 17. A, C, E    |
| 5. D  | 18. A, B       |
| 6. B  | 19. A, B, D    |
| 7. B  | 20. B, C       |
| 8. D  | 21. A, B, C    |
| 9. C  | 22. A, B       |
| 10. B | 23. D, E       |
| 11. C | 24. A, C, D    |
| 12. B | 25. B, D       |
| 13. D | 26. B, C, D, E |

194 REZIDENȚIAT FARMACIE. TESTE GRILĂ DE FARMACOLOGIE ȘI TOXICOLOGIE

- 27. B, C, D, E
- 28. B, C, D
- 29. B, C, E
- 30. D, E
- 31. A, B, C
- 32. A, C
- 33. A, B, D
- 34. B, C, D, E
- 35. A, B, D