

TEMA VII. Farmacologia tulburărilor aparatului digestiv**III. Antidiareice și antiinflamatoare intestinale****COMPLEMENT SIMPLU – UN SINGUR RĂSPUNS CORECT**

1. **Este antisecretor opioidergic:**
 - A. Acetorfanul
 - B. Budesonida
 - C. Olsalazina
 - D. Mesalazina
 - E. Loperamida

2. **Alegeți terapia care nu se utilizează la copii în diaree:**
 - A. Acetorfan
 - B. Diosmectita
 - C. SRO
 - D. Sulfasalazina
 - E. Linaclotida

3. **Nu este indicată în tratamentul etiologic al diareei infecțioase:**
 - A. Azitromicina
 - B. Doxiciclina
 - C. Ciprofloxacina
 - D. Ampicilina
 - E. Amoxicilina

4. **Enzimelor digestive utilizate în farmacoterapia diareei sunt următoarele, cu excepția:**
 - A. Maltaza
 - B. Amilaza
 - C. Fosfataza
 - D. Lipaza
 - E. Lactaza

5. **Selectați enunțul adevărat despre terapia farmacologică în diaree:**
 - A. Loperamida se utilizează doar în diareea acută
 - B. Subsalicilatul de bismut este adsorbant al toxinelor microbiene
 - C. Loperamida se utilizează doar în diareea cronică
 - D. Opioidele nu agravează diareea infecțioasă
 - E. Acetorfanul nu este indicat în diareea acută la copii și sugari

6. **În funcție de mecanismul de acțiune antidiareicele se clasifică după locul și mecanismul de acțiune astfel, cu excepția:**
 - A. Antipropulsive parasimpatomimetice
 - B. Antipropulsive opioidergice
 - C. Antiinflamatoare intestinale
 - D. Adsorbante și protectoare ale mucoaselor
 - E. Antisecretoare opioidergice

7. **Adsorbante și protectoarele mucoaselor, care cresc vâscozitatea și cantitatea mucusului protector din intestin sunt următoarele, cu excepția:**
 - A. Sărurile de Ca
 - B. Sărurile de Bi
 - C. Caolin

- D. Diosmectita
E. Sărurile de Mg
8. **Medicamentul indicat în boala Crohn și colita ulcerosă:**
A. Sulfasalazina
B. Acetorfan
C. Loperamida
D. Diosmectita
E. Propantelina
9. **Din categoria antidiareicelor etiotrope fac parte următoarele substanțe, cu excepția:**
A. Furazolidon
B. Nifuroxazid
C. Clorchinaldol
D. Colistina
E. Budesonida
10. **În diaree de putrefacție se administrează:**
A. Săruri de Bi
B. Loperamida
C. Săruri de Ca
D. Acetorfan
E. Sulfasalazina
11. **În rectocolita hemoragică se administrează:**
A. Sulfasalazina
B. Octreotid
C. Loperamida
D. Difenoxilat
E. Săruri de Ca
12. **Pentru racecadotril sunt valabile următoarele afirmații, cu excepția:**
A. Este un prodrug, inhibitor de enkefalinază
B. Este un antisecretor intestinal pur
C. Scade hipersecreția intestinală de apă și electroliți indusă de inflamație și toxine
D. Se administrează în diaree acută
E. Nu se administrează la sugari și copii
13. **Reacții adverse pe care le produce salicilatul de Bi, sunt următoarele, cu excepția:**
A. Stomatită
B. Encefalopatie la doze mari
C. Colorează limba în negru
D. Colorează fecalele în negru
E. Bactericid pe *Campylobacter pylori* și jejunii
14. **Tratamentul etiologic al diareei infecțioase (conform ghidurilor ESPGHAN 2014 și FISPGHAN 2020) pentru dizenterie și giardia includ următoarele medicamente, cu excepția:**
A. Metronidazol
B. Albendazol
C. Tinidazol
D. Cotrimoxazol
E. Nistatina

126 REZIDENTIAT FARMACIE. TESTE GRILĂ DE FARMACOLOGIE ȘI TOXICOLOGIE

15. Se folosesc în terapie următoarele antidiareice etiotrope, cu excepția:
- Budesonida
 - Natamicina
 - Nistatina
 - Colistina
 - Rifaximina
16. Se folosesc în terapie următoarele antiinflamatoare intestinale, cu excepția:
- Mesalazina
 - Sulfasalazina
 - Olsalazina
 - Budesonida
 - Rifaximina
17. Recomandări privind regimul alimentar în tratamentul diareei:
- Supe de legume limpezi
 - Pâine albă prăjită
 - Fructe coapte, compoturi
 - Alimentele bogate în grăsimi sau glucide
 - Mucilagii de orez
18. Etiologia diareei este plurifactorială, cauzele sunt menționați mai jos, cu excepția:
- Infecții digestive bacteriene
 - Infecții digestive parazitare
 - Dismicrobism intestinal
 - Digestie completă
 - Infecții digestive virale
19. Reacțiile adverse date de administrarea metoclopramidei sunt următoarele, cu excepția:
- Constipație
 - Amenoree
 - Galactoree
 - Scăderea libidoului
 - Ginecomastie
20. Principiile de tratament medicamentos în diaree includ, cu excepția:
- În diareea de cauză neinfecțioasă se administrează antipropulsive opioidergice
 - În diareea de cauză infecțioasă se administrează antipropulsive opioidergice
 - În diaree de putrefacție se administrează săruri de Bi
 - În diaree de fermentație se administrează săruri de Ca
 - Profilaxia dismicrobismului secundar antibioterapiei se administrează *Saccharomyces boulardii*

COMPLEMENT MULTIPLU: 2, 3, 4 RĂSPUNSURI CORECTE

21. Subsalicilatul de bismut este utilizat frecvent în:
- Diaree de putrefacție
 - Diaree care necesită refacerea microflorei colonului
 - Diaree dată de rotavirus
 - Situații care necesită rehidratarea orală
 - Diareea călătorului
22. Tratamentul fiziopatogenic al diareei include administrarea de:
- Săruri de Mg
 - Săruri de Ca

- C. Săruri de Bi
D. Loperamida
E. Racecadrotil
23. **Sunt corecte următoarele enunțuri:**
A. Sulfasalazina este indicată în colita ulceroasă
B. Sulfasalazina este indicată în colopatii acute și cronice
C. Sulfasalazina este indicată în boala Crohn
D. Sulfasalazina este indicată la pacienții cu deficiență de G6PD
E. Sulfasalazina este indicată în poliartrita reumatoidă
24. **Reacțiile adverse date de administrarea loperamidei sunt:**
A. Constipație
B. Diaree
C. Somnolență
D. Amețeală
E. Greață și vărsături
25. **Sunt corecte următoarele enunțuri:**
A. Acetofanul este un pro-drog
B. Acetofanul este inhibitor de enkefalinază
C. Acetofanul este un antisecretor intestinal
D. Acetofanul nu se administrează la copii
E. Acetofanul se poate administra din prima zi de viață
26. **Reacțiile adverse date de administrarea salicilatului de Bi sunt:**
A. Stomatita
B. Diareea
C. Colorarea fecalelor în negru
D. Colorarea urinei
E. Colorarea limbii
27. **Adsorbante și protectoare ale mucoaselor utilizate ca antidiareice:**
A. Sărurile de calciu
B. Sărurile de bismut
C. Propantelina
D. Pectine
E. Fenpipramida
28. **Antidiareicele de substituție sunt:**
A. Soluții de electroliți pentru rehidratare
B. Enzimele digestive
C. Antiinflamatoarele intestinale
D. Adsorbante și protectoare ale mucoasei
E. Antipropulsive parasimpatolitice
29. **Factorii care pot induce diaree:**
A. Sindroame de malabsorbție
B. Infecții digestive bacteriene
C. Dismicrobismul intestinal
D. Leziuni ale plexului mezenteric
E. Infecțiile parazitare

128 REZIDENȚIAT FARMACIE. TESTE GRILĂ DE FARMACOLOGIE ȘI TOXICOLOGIE

- 30. Se folosesc ca antidiareice antagoniștii receptorilor muscarinici intestinali:**
- A. Butilscolamina
 - B. Propantelina
 - C. Betanecol
 - D. Neostigmină
 - E. Fenpipramida
- 31. Subsalicilatul de bismut are următoarele efecte:**
- A. Bactericid
 - B. Antiinflamator
 - C. Adsorbant
 - D. Antiviral
 - E. Neutralizant
- 32. Antipropulsivele opioidergice indicate în diareea acută și cronică neinfecțioasă sunt:**
- A. Codeina
 - B. Loperamid
 - C. Acetorfan
 - D. Racecadrotil
 - E. Fenpipramida
- 33. Loperamida:**
- A. Este un propulsiv opioidergic
 - B. Este agonist pe receptorii μ de la nivelul plexului mezenteric
 - C. Inhibă motilitatea gastrointestinală
 - D. Se utilizează în doză de 4 -8 mg, maxim 16 mg
 - E. Scade tonusul intestinului subțire și al colomului
- 34. Reacțiile adverse determinate de sulfasalazină sunt:**
- A. Hiposalivație
 - B. Greață
 - C. Diaree
 - D. Tinitus
 - E. Amețeală
- 35. În categoria medicamentelor antidiareice sunt incluse:**
- A. Adsorbante
 - B. Probiotice
 - C. Analozi ai somatostatinei
 - D. Propulsive opioidergice
 - E. Antibiotice
- 36. Alegeți enunțurile corecte referitoare la principiile de tratament în diareea de cauză neinfecțioasă:**
- A. Se administrează antipropulsive opioidergice
 - B. Loperamida este frecvent recomandată în tratamentul cazurilor de diaree acută și cronică
 - C. Difenoxinul este un antidiareic, derivat difenoxilat, înrudit chimic cu codeina
 - D. Diosmectita este un citoprotector, indicată în tratamentul cazurilor de diaree acută și cronică
 - E. Octreotidul este un analog ai somatostatinei, indicat în gastrinom sau vipom

37. **Reacțiile adverse frecvente date de SRO sunt:**
- A. Hiperpotasemie
 - B. Hipopotasemie
 - C. Inflamație cutanată
 - D. Vomă
 - E. Reacții anafilactice
38. **În sindromul diareic hemoragic principiile de tratament medicamentos includ:**
- A. Se administrează antipropulsive opioidergice
 - B. Se administrează sulfasalazină
 - C. Se administrează corticosteroizi
 - D. Se administrează metronidazol
 - E. Se administrează sulfapirină
39. **În diaree acută se recomandă:**
- A. Rehidratare cu soluții de electroliți administrate pe cale orală sau parenterală
 - B. Dietă fără lapte
 - C. Tratament medicamentos simptomatic-patogenic sau etiologic, atunci când durata diareei este de peste 24 ore
 - D. Tratament medicamentos simptomatic-patogenic sau etiologic, atunci când durata diareei este de peste 72 ore
 - E. La sugar se menține alăptatul la sân
40. **Alegeți enunțurile corecte referitoare la principiile de tratament în diareea de cauză neinfecțioasă:**
- A. Se administrează antipropulsive opioidergice
 - B. Loperamida este frecvent recomandată în tratamentul cazurilor de diaree acută și cronică
 - C. Difenoxinul este un antidiareic, derivat difenoxilat, înrudit chimic cu codeina
 - D. Diosmectita este un citoprotector, indicată în tratamentul cazurilor de diaree acută și cronică
 - E. Octreotidul este un analog ai somatostatinei, indicat în gastrinom sau vipom
41. **Loperamida prezintă următoarele indicații terapeutice:**
- A. Diareea călătorului
 - B. Diareea acută
 - C. Diareea cronică
 - D. Diareea cu componentă inflamatorie
 - E. Diareea cu componentă infecțioasă

TEMA VII. Farmacologia tulburărilor aparatului digestiv

IV. Medicamente utilizate în BRGE

COMPLEMENT SIMPLU: UN SINGUR RĂSPUNS CORECT

1. **Alegeți enunțul corect referitor la principiile de tratament în BRGE:**
- A. Propulsivele gastrointestinale sunt medicamente utilizate în sindromul de hipermotilitate gastrică
 - B. Neostigmina este un parasimpatomimetic direct, indicat în cazuri grave de meteorism datorat atoniei gastrointestinale postoperatorii
 - C. Administrarea gastroprokineticelor se face după masă
 - D. Betanecolul este un parasimpatomimetic indirect
 - E. Domperidona este recomandată copiilor peste 12 ani și adulților